



Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

Boletín Informativo nro. 101 - Diciembre 2018

“El Rayador” (*Rynchops niger*)

Familia Rynchopidae

El Rayador (*Rynchops niger*) es un ave emparentada con las gaviotas (Fam. *Laridae*), los salteadores (Fam. *Stercorariidae*) y los frailecillos (Fam. *Alcidae*). En cuanto a la coloración del plumaje, se caracteriza por presentar el dorso negro y el vientre blanco. Su distintivo pico es de color rojizo y la punta es oscura. Estos dos detalles lo diferencian de sus congéneres africano y asiático. Una característica que la distingue de las demás especies es la pupila vertical, como la de lagartos y serpientes; y con cinco veces más bastoncitos que las otras aves, lo que le permite estar activo toda la noche. El modo de obtención de su alimento radica en la flexibilidad de la mandíbula, que le permite cortar el agua con el pico en vuelo lento, detectando a sus presas por tacto. Por eso mismo, *Rynchops* significa “pico que corta”.



Foto: Alfredo Cortez

El Rayador es una especie social. Nidifica en colonias sobre bancos de arena de ríos (siempre que en el sitio haya habido alguna colonia de gaviotines previamente), y forma grandes bandadas fuera de la época reproductiva. En ocasiones comparte el área de nidificación con gaviotines, quienes a su vez incrementan las acciones de protección.

Los jóvenes, en el primer año de vida, completarán el reemplazo del plumaje juvenil en superposición con el inicio de otra muda, ambas en primavera. De este modo llegarán al verano casi indistinguibles de los mayores. Sin embargo, normalmente llegan a la adultez a los 3-4 años de vida, como las gaviotas.

Las primeras menciones del Rayador para la provincia de Córdoba datan de mediados del siglo pasado (Zotta 1944), y según parece, estaría presente en la provincia todo el año (Salvador et al. 2017). En Córdoba tenemos dos subespecies: *R. niger intercedens* y *R. niger cinerascens*, siendo esta última la que vendría de regiones amazónicas para pasar los meses estivales y mudar en nuestra región.



Foto: Hugo Giraudo

Diferenciar subespecies en muchas aves es complicado, particularmente si lo que distingue una de otra es tan sutil que ni aun el ojo más experimentado logra discernir. En la foto con dos ejemplares que Hugo Giraudo obtuvo en Mar Chiquita (Córdoba), se ven claramente las diferencias entre ambas subespecies, siendo *intercedens* la de coloración pálida debajo del ala. También se aprecia en esta última la ancha banda blanca en secundarias y primarias internas, así como las timoneras claras. Por su parte, *cinerascens* es más oscura, presenta tapadas grisáceas, la banda

blanca en secundarias es muy angosta e inexistente en las primarias internas, y las timoneras son de un gris oscuro (Wetmore 1944). Asimismo, en la foto de Fredy Cortéz se destaca un macho joven de la subespecie *intercedens*, en su primer primavera. En este individuo se distinguen los bordes pálidos en plumas del dorso y corona, que indican juvenil. Marcado contraste con algunas pocas plumas oscuras, del formativo.

Reconocer subespecies es esencial para entender las preferencias de hábitat y modos de uso de los recursos. Esto brindará valiosa información al momento de plasmar planes de conservación. De este modo, proteger un lugar que emplea una o más especies para mudar, podría en algunos casos ser más importante que proteger un sitio de reproducción o área de paso en migración.

Texto: *Juan Klavins* - Fotos: *Hugo Giraudo* y *Alfredo Cortez*