



# Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

## Boletín Informativo Nro. 50 Julio de 2010

### La especie del mes: *Vultur gryphus* (Familia Cathartidae)

El Cóndor Andino es considerado una de las aves voladoras más grandes del mundo. Pertenece a la familia Cathartidae (Buitres del Nuevo Mundo), palabra derivada del griego "Kathartes" que significa "el que limpia", quedando clara una de sus funciones biológicas en el ecosistema. Es el único miembro de la familia que posee dimorfismo sexual, es decir macho y hembra tienen caracteres externos diferentes: El macho tiene cresta y ojos color castaño y puede pesar hasta 13 kg, mientras que las hembras no tienen cresta y sus ojos son de color rojo y llegan a pesar hasta 10 Kg. En la edad adulta pueden llegar hasta 1.30 m de estatura y sobrepasar los 3 m de envergadura. El plumaje de los adultos es de color negro, con el dorso de las alas de color blanco y el notable collar del mismo color que comparten macho y hembra. Los juveniles son de color marrón desde el nacimiento, hasta tomar el color de los adultos con el paso

de los años. Si bien en cautiverio se han podido observar y estudiar aspectos de la reproducción, en el medio natural estos son distintos y varían en las diferentes regiones. Al parecer, se reproducirían cada dos o tres años. Después de nacido el





# Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

pichón es alimentado en el nido de 6 a 8 meses con carne regurgitada que los padres le acercan. Al salir del nido acompaña a los padres hasta que, al llegar al año y medio o dos, se integra a los grupos de adultos y juveniles para volar con ellos, pernoctar y competir por el alimento. En la provincia de Córdoba, las poblaciones de Cóndores son relativamente fáciles de observar, dada la altura de las serranías y la gran cantidad de alimento disponible, principalmente durante o después del invierno, cuando la mortandad de vacas y caballos es muy alta. Es sabido que el Cóndor Andino nidifica en las Sierras Grandes, Sierras Chicas y las Sierras de Pocho. Si bien existe la creencia de que los cóndores que habitan la cordillera son más grandes que los que habitan las sierras pampeanas, novedosos estudios han demostrado que esto no es cierto. En los últimos años, algunos individuos han sido marcados y seguidos con tecnología satelital, gracias a la cual se han descubierto interesantes datos, como que vuelan hasta los 6000 mts de altura cuando cruzan de Chile a nuestro país y que recorren hasta 200 Km en un día en busca de alimento. De amplia distribución, otrora abarcaban terrenos desde Venezuela y Colombia hasta Tierra del Fuego. La población actual estimada total es de 6.200 ejemplares, concentrada principalmente en Argentina y Chile.

© Texto: Javier Heredia y Joaquín Piedrabuena. Fotografía: Marcelo Trevison – Ecosistemas Argentinos