



# Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

Boletín Informativo nro. 87 - Noviembre 2015

## La especie del mes: Gallito de collar (*Melanopareia maximiliani*)

*Melanopareia maximiliani* (D'Orbigny, 1835)  
Gallito de collar - Olive-crowned Crescentchest  
Familia: **Melanopareiidae**

Los integrantes de esta familia son considerablemente distintos a los miembros de la familia Rhinocryptidae, en la cual tradicionalmente eran incluidos. Esta familia lleva como nombres comunes los de "gallitos" o "tapaculos" y pertenecen todos a un sólo género: *Melanopareia*. Las 4 especies que lo componen se distribuyen en regiones cálidas del centro de América del Sur, siendo características de sabanas arbustivas. Sus voces están compuestas por series de silbos monótonos y sostenidos.



La especie que habita nuestro país es *Melanopareia maximiliani* (D'Orbigny, 1835). La encontramos en el oeste de la Argentina, Bolivia y Paraguay. Una de las regiones de su distribución donde es más frecuente son las sierras de Córdoba. Su tamaño es de unos 15cm. Los sexos no presentan diferencias: el dorso es amarronado oliva, la región ventral rojizo anaranjado, garganta canela, antifaz y collar negros, ceja fina y clara, cola que a veces eleva. Muy oculto, anda por el suelo y estrato bajo del monte. Algunos ejemplares tienen una manchita blanca en la espalda que se observa mejor en vuelo. Nidifica en primavera y verano. El nido de esta especie es desconocido pero se supone que es similar al de otros de su género, que consiste en una taza construida de fibras vegetales a baja altura.

En Córdoba ocupa los bosques bajos de tipo serrano y pastizales en laderas de las sierras. Su vocalización es un trino constante que parece provenir de un insecto o un anfibio. Usa también una voz de contacto "tac tac". Aunque es una especie común en las sierras, por sus hábitos es difícil de observar.





# Ecosistemas Argentinos

ASOCIACIÓN CIVIL

En nuestro país (y en Córdoba) hay dos razas:

***Melanopareia maximiliani argentina*** (Hellmayr, 1907)

Bolivia, Argentina y Serranías Centrales

Es la especie que vemos en las sierras. En Argentina se la encuentra hasta los 2.500 metros de altura en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, San Luis y Santiago del Estero.

***Melanopareia maximiliani palida***, descrita por Nores e Yzurieta, 1980


Vocaliza de manera bastante diferente a la anterior y habita zonas llanas, por ejemplo en cercanías de Mar Chiquita.

Bolivia y Paraguay, en la región chaqueña de esos países.

En Argentina en Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y el este de Córdoba.

(La imagen muestra claramente la distribución de *Melanopareia maximiliani* en Argentina)

Finalmente algunos autores creemos que *Melanopareia maximiliani palida* se trataría de una especie plena, que debería ser descrita como tal.



Las otras especies del género *Melanopareia*:

- *Melanopareia elegans* habita en el oeste de Ecuador y el noroeste del Perú, hasta cercanías de la costa del Pacífico.
- *Melanopareia maranonica* vive en el sur de Ecuador y el norte del Perú. En estas dos especies hay dimorfismo sexual, que en los machos se caracteriza por el color más oscuro del collar negro y el pecho canela rojizo.
- *Melanopareia torquata* habita en el centro y este del Brasil, y en el extremo oriental del Paraguay; estaría extinta en el noreste de la Argentina

© Texto y mapa de distribución: Javier Heredia / Ecosistemas Argentinos

© Fotografías: Fernando Ficetti / Ecosistemas Argentinos